



د افغانستان اسلامي امارت
د علومو اکاډمي
د طبيعي - تخنيکي علومو معاونيت
د کيميا، بيولوژي او کرنې د علومو مرکز
د کرنې انستيتوت



د خوړو جوارو د (FAO 290) ګروپ د هايبرېډونو د ودې او اقتصادي ارزښت مطالعه

وړاندې کوونکی: څېړندوی محمد منیر نظيري

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ځينې اصطلاح گانې

1 - **Inbred line**: دا هغه نبات دی چې د خپلې گردې د القاح په واسطه (Self Pollination) په مصنوعي ډول د انسان په واسطه د 5 - 7 کلونو په اوږدو کې منځته راځي.

2 - **Hybrid**: د هغو نسلونو څخه عبارت دي چې د دوه يا څو خالصو لاینونو يا Inbred line ترمنځ د القاح په واسطه منځته راځي چې د لاینونو په نسبت یې د حاصلاتو کچه 20 - 30 سلنو پورې ډېره وي.

3 - **Single Cross**: د دوو Inbred lines القاح کیدو په نامه یادېږي.

4 - **Double Cross**: د دوو Single Crosses یو له بل سره القاح کېدو ته ویل کېږي.

5 - **Three ways cross**: له یو Inbred line او یو Single Cross له القاح څخه منځته راځي.

6 - **Synthetic**: هغه جوار دي چې د څو بېلابېلو Inbred lines له القاح څخه رامنځته کېږي.

Type of Crosses د ترویج ډولونه

Single cross


Double Cross

Three – ways Cross


(AXB)

(AXB) (CXD)

(AXB) C



خلورم شکل: د Single cross په واسطه د جوارو د نارینه او
ښځینه بوټو تزویج



پنجم شکل: د Double Cross په واسطه د جوارو د بوټو تزويج

د خپرنې مواد او مېتود

دا خپرنه د 2019 - 2020 کلونو په اوردو کې د کرسنadar د منطقي په مرکزي زون کې ترسره شوه.

نوي جنيتيکي مواد د خوړو جوارو د هغو ورايتي گانو په اساس رامنځته شول، کومې چې له امريکا او جاپان څخه ترلاسه شوې وې.

يادې ورايتي گانې د کرسنadar په منطقه کې لږ حاصل ورکوونکې وې، له همدې امله دا خپرنه ترسره شوه، ترڅو د منطقي د شرايطو سره توافق کوونکې لور حاصله د خوړو جوارو هايبرېډونه رامنځته شي.

د منطقې د شرایطو سره د توافق کوونکو نویو جنیټیکي موادو د لاسته راوړلو په موخه، د یادو ورايتي گانو له ډلې څخه د خوړو جوارو اووه ورايتي گانې وټاکل شوې.

د جنیټیکي پایې د پراختیا لپاره چې د منطقې د شرایطو سره توافق ولري، لومړی د څېړنې په پیل کې د خوړو جوارو اووه ورايتي گانې د Single Backcross په میتود تزویج شوې.

انتخاب Selection

د انتخاب (Selection) په پروسه کې د معمولي جوارو لاینونه چې د پېژندنې خصوصیات (Pedigree) یې معلومه وه، شامل وه.

له یادو لاینونو څخه هغه لاینونه انتخاب کړای شول، کومو چې د خوړو جوارو سره د ښه ترکیب وړتیاوې درلودې.

وروسته بیا د انتخاب شویو لاینونو د له ګډون څخه د خوړو جوارو نوي هایبرېډونه رامنځته شول، چې د څېړنې پایلې په راتلونکو جدولونو کې راوړل کېږي.

د خپرنې شرایط

په 2019 کال کې د جوارو د ودې په دوران (مې، جون، جولای) میاشتو کې د اوربنت کچه 213.4 ملي متره، او په 2020 کې له مې څخه تر جولای پورې د اوربنت کچه 173.6 ملي متره وه.

تودوخې درجه د جولای د میاشتې په لومړۍ لسيزه کې په منځني ډول 36 درجې د سانتي گراد او مطلقه اعظمي تودوخه تر 39.8 درجو د سانتي گراد پورې لوړه شوې وه.

د خاورې ډول ضعیف چرنیوزوم (تورې خاورې)

لومړۍ جدول: د 290 FAO ګروپ مطالعه شوي هايبرېډونه

شماره	هايبرېډ
1	اوسلادا (ستندرد)
2	کرسنادار خواړه جوار 290
3	کرسنادار خواړه جوار 291
4	کرسنادار خواړه جوار 292
5	کرسنادار خواړه جوار 293
6	کرسنادار خواړه جوار 294
7	کرسنادار خواړه جوار 295
8	کرسنادار خواړه جوار 296
9	کرسنادار خواړه جوار 297
10	کرسنادار خواړه جوار 298
11	کرسنادار خواړه جوار 299

د خپرنې په جريان کې د خوړو جوارو د هايبرېډونو
لاندیني پارامترونه مطالعه شوي:

- ❖ د نبات قد؛
- ❖ د ځمکې د سطحې څخه په بوټو کې د جوارو د وړو د زرغونېدو لوړوالی؛
- ❖ په بوټي کې د پاڼو شمېر؛
- ❖ د جوارو له توکې څخه په لاس راغلو حاصلاتو کچه؛
- ❖ د یوه وري وزن؛
- ❖ ناروغ وري؛
- ❖ له تېغ وهنې تر د وړو او د جوارو د شنه کېدو پورې د ورځو شمېر؛
- ❖ له تېغ وهنې تر د حاصل پخېدو پورې و ورځو شمېر.





دويم جدول: د خوړو جوارو (FAO 290) گروپ د هايبرېډونو تېغ وهنه او په پلاټ کې د بوټو شمېر

شماره	هايبرېډ	په پلاټونو کې د کرل شويو تخمونو شمېر/دانه	په پلاټونو کې د بوټو شمېر/دانه	د تېغ وهنې سلنه
1	اوسلادا (ستندرد)	40	36	89
2	کرسنادار خواړه جوار 290		36	88,6
3	کرسنادار خواړه جوار 291		36	85,7
4	کرسنادار خواړه جوار 292		36	87,8
5	کرسنادار خواړه جوار 293		34	85,4
6	کرسنادار خواړه جوار 294		36	90,3
7	کرسنادار خواړه جوار 295		35	85,8
8	کرسنادار خواړه جوار 296		37	90,0
9	کرسنادار خواړه جوار 297		37	90
10	کرسنادار خواړه جوار 298		35	88,4
11	کرسنادار خواړه جوار 299		35	75

د 2019 - 2020 کلونو د اپریل په 12 نېټه په هر څېړنیز پلاټ کې د یاد ګروپ د هایبرېډونو 40 تخمونه وکرل شول.

د 3-5 ورځو په توپیر سره تخمونو تیځنې ووهلې.

د 290 FAO ګروپ د هایبرېډونو په منځ کې د کرسنادر 294, 296, 297 هایبرېډونو د تخمونو د تیځ وهنې سلنه لوړه وه.

د بوټو شمېر په اوسط ډول په یادو پلاټونو کې 36 وه.

دریم جدول: له کښت څخه تر په بوټو کې 50 سلنه پورې د وړو او ګلانو (Tassels) د زرغونېدو موده

شماره	هایبرېډ	د ګلانو (Tassels) راوتل / ورځې	د وړو راوتل / ورځې
1	اوسلادا (ستندرد)	80	82
2	کرسنadar خواړه جوار 290	79	82
3	کرسنadar خواړه جوار 291	79	82
4	کرسنadar خواړه جوار 292	79	82
5	کرسنadar خواړه جوار 293	79	82
6	کرسنadar خواړه جوار 294	80	83
7	کرسنadar خواړه جوار 295	80	83
8	کرسنadar خواړه جوار 296	82	85
9	کرسنadar خواړه جوار 297	80	83
10	کرسنadar خواړه جوار 298	80	83
11	کرسنadar خواړه جوار 299	80	82

خلورم جدول: د 290 FAO گروپ د هايبرېډونو ځيني مورفولوژيکي ځانگړتياوې

شماره	هايبرېډ	د پاڼو شمېر/ دانه	د بوټو لوړوالی / cm	د ځمکې له سطحې څخه په بوټو کې د وړو د را وتلو لوړوالی/cm
1	اوسلادا (ستندرد)	16	169,4	64,3
2	کرسنادار خواړه جوار 290	17	179.1	75.5
3	کرسنادار خواړه جوار 291	17	168.1	77.4
4	کرسنادار خواړه جوار 292	17	163.2	79
5	کرسنادار خواړه جوار 293	17	169,5	68.4
6	کرسنادار خواړه جوار 294	16	170.7	64.6
7	کرسنادار خواړه جوار 295	18	162.1	65.1
8	کرسنادار خواړه جوار 296	18	173.1	69.5
9	کرسنادار خواړه جوار 297	18	175	62.3
10	کرسنادار خواړه جوار 298	17	165.2	66.1
11	کرسنادار خواړه جوار 299	17	154.8	60.8

پنځم جدول: د 2019 - 2020 کلونو کې د FAO 290 ګروپ د غوره هايبرېډونو څخه لاس ته راغلي حاصلات (ټن / هکتار)

2020				2019				هايبرېډونه
د يو وري حاصل/ گرام	د يو وري وزن/ګرام م	له سټنډر څخه توپير ټن/هکتار ر	د حاصل کچه ټن/هکتار	د يو وري حاصل/ گرام	د يو وري وزن / ګرام	له سټنډر څخه توپير ټن/ه کتار	د حاصل کچه ټن/هکتار	
52.3	135.7	-	10.580	58.7	152.3	-	10.580	اوسلادا (سټنډرډ)
78.7	185.7	1.92	12.5	73.05	172.3	3.2	13.8	ګرسنادار خواړه جوار 290
67.2	168.7	2.57	13.15	70.55	177.1	4.4	15	ګرسنادار خواړه جوار 291
62.4	157	1.17	11.75	65.6	165	3.4	14	ګرسنادار خواړه جوار 292

شپږم جدول: په 2020 - 2019 کلونو کې د FAO 290 ګروپ د خوړو جوارو د غوره هایپرېډونه څخه په منځني ډول په لاس راغلي حاصلات ټن / هکتار

د تورکي په (Smut) واسطه مصاب شویو وړو سلنه	د یو وړي حاصل / ګرام	د یو وړي وزن / ګرام	له ستندر څخه توپیر ټن / هکتار	د حاصل کچه ټن / هکتار	هایپرېډونه
5,0	55.5	144	-	10.58	اوسلادا (ستندر)
3,7	75.8	179	2.57	13.15	ګرسنادار خواړه جوار 290
4,8	68.8	173	3.49	14.07	ګرسنادار خواړه جوار 291
8,0	64	161	2.29	12.87	ګرسنادار خواړه جوار 292

اووم جدول: د 290 FAO ګروپ د غوره هايبرېډونو اقتصادي اغېزمنتوب

د اغېزمنتوب سلنه	خالصه ګټه افغاني / هکتار	ناخالصه ګټه / افغاني	ټول توليدي مصرف افغاني / هکتار	د يو ټن حاصل بيعه / افغاني	حاصل ټن / هکتار	هايبرېډونه
496.9	344378	413678	69300	39100	10.58	اوسلادا (ستندرد)
641.9	444865	514165			13.15	کرسنadar خواړه جوار 290
729.3	505470	574770			14.7	کرسنadar خواړه جوار 291
626.1	433917	503217			12.87	کرسنadar خواړه جوار 292

پایلی

د دې څېړنې څخه لاندې پایلې ترلاسه کېږي:

- د جوارو د لاینونه په نسبت د جوارو هایپرېډونه د لوړ حاصل درلودونکي دي.
- د بوټو د لوړوالي له اړخه د FAO 290 ګروپ هایپرېډونو په منځ کې د کرسنادار 290 هایپرېډ بوټي د لوړ قد درلودونکي ول چې په منځني ډول یې د بوټو لوړوالی 179,1 cm وه او د کرسنادار 299 هایپرېډ د بوټو لوړوالی په منځني ډول 154,8 cm ته رسېږي چې نسبت نورو هایپرېډونو ته یې د بوټو قد ټیټ وه.
- دپاڼو شمېر د FAO 290 ګروپ په ټولو هایپرېډونو کې توپیر درلود چې پاڼو شمېر له 16 - 18 متغیر وه.
- د FAO 290 خوړو جوارو هایپرېډونو په ګروپ کې د کرسنادار 290, 291, 292 هایپرېډونو د ښه حاصل درلودونکي دي حاصلات یې په ترتیب سره 13.15، 14.7 او 12.87 ټنه وه چې د اغېزمنتوب کچه یې په ترتیب سره 641.9، 729.3 او 626.1 سلنه ده.

وړاندیزونه

1. څرنګه چې د جوارو دوه رګه کول یو مغلق پروګرام دی او ډېر وخت ته اړتیا لري، له دې امله د افغانستان د علومو اکاډمۍ ته وړاندیز کېږي ترڅو د کرنې انستیتوت لپاره دې د یاد پروګرام د پلي کولو په موخه مناسب شرایط برابر کړي.

2. د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ محترم وزارت ته وړاندیز کېږي چې د هېواد اقلیمي شرایطو ته په کتو سره دې د جوارو د لوړ حاصل لاس ته راوړلو په موخه د جوارو د تخمونو د دوه رګه کولو په برخه کې څېړنې ترسره کړي.

3. بزګرانو او د کرنې ماهرینو ته وړاندیز کېږي چې د کښت به موخه دې یواځې د F_1 هایبرېډ تخمونه وپېري.

له پاملرني مو مننه

